

# Povinný očkovací kalendář a další možnosti očkování v praxi dětského lékaře

## Povinná očkování

## Nepovinná očkování

<b>KOJENEČEK</b>	9. týden	<b>Hexavakcína</b> 1. dávka		<b>Rotaviry</b> 2 dávky vakcíny podávané ústy, od 6 týdnů do 24. týdne	<b>Rotarix™</b>
	3. měsíc	<b>Hexavakcína</b> 2. dávka		<b>Pneumokok</b> plně hrazen ZP* 1. dávka	<b>Synflorix™</b>
	4. měsíc	<b>Hexavakcína</b> 3. dávka		<b>Pneumokok</b> plně hrazen ZP* 2. dávka	<b>Synflorix™</b>
	5. měsíc			<b>Pneumokok</b> plně hrazen ZP* 3. dávka	<b>Synflorix™</b>
	11.–15. měsíc			<b>Pneumokok</b> plně hrazen ZP* 4. dávka	<b>Synflorix™</b>
<b>BATOLE</b>	15. měsíc	<b>Spalničky, zarděnky, příušnice</b> 1. dávka	nebo	<b>Spalničky, zarděnky, příušnice, plané neštovice</b> 2 dávky s minimálním odstupem 4 týdny <b>Priorix-Tetra™</b> lze použít jako alternativu k povinné vakcinaci proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím.	<b>Priorix-Tetra™</b>
	do 18. měsíce	<b>Hexavakcína</b> 4. dávka			
	21.–25. měsíc	<b>Spalničky, zarděnky, příušnice</b> 2. dávka			
<b>PŘEDŠKOLÁK a MLADŠÍ ŠKOLÁK</b>	3.–5. rok			<b>Žloutenka typu A</b> 2 dávky	<b>Havrix™</b>
	5.–6. rok	<b>Záškrt, tetanus, dávivý kašel</b> přeočkování		<b>Klíšťová encefalitida</b> 3 dávky	<b>Varilrix™</b>
	10.–11. rok	<b>Záškrt, tetanus, dávivý kašel, dětská přenosná obrna</b> přeočkování		<b>Plané neštovice</b> 2 dávky	<b>Fluarix™</b>
<b>ADOLESCENT</b>	v péči pediatra až do 19 let			<b>Rakovina děložního čípku</b> 3 dávky	<b>Cervarix™</b>
	12 let	<b>Žloutenka typu B</b> dříve neočkovaní, ročník narození 1999		<b>Plané neštovice</b> 2 dávky	<b>Varilrix™</b>
	14 let	<b>Tetanus</b> dříve neočkovaní, ročník narození 1997		<b>Žloutenka typu A</b> 2 dávky	<b>Havrix™</b>
				<b>Klíšťová encefalitida</b> 3 dávky	
				<b>Meningokok C nebo A, C, W, Y135</b> 1 dávka	
				<b>Chřipka</b> 1 dávka každý rok**	<b>Fluarix™</b>
			nebo	<b>Tetanus, záškrt a dávivý kašel</b> 1 dávka	<b>boostrix™</b>

Hexavakcína – očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské přenosné obrně, žloutence typu B, onemocněním způsobeným bakterií *Haemophilus influenzae* typu b.

Všechny výše uvedené vakcíny jsou registrované léčivé přípravky a jsou vázány na lékařský předpis. Před použitím si pečlivě prostudujte příbalovou informaci.

Vakcíny Rotarix™, Havrix™, Priorix-Tetra™, Cervarix™, Boostrix™, Varilrix™, Fluarix™ nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

\* Synflorix™ je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění pro děti, které splňují podmínky dané zákonem 362/2009 Sb.

\*\* Dětem do 9 let věku, které dosud nebyly očkovány, by měla být podána druhá dávka. Interval mezi dávkami musí být nejméně 4 týdny.

**Zeptejte se na možnosti očkování svého praktického dětského lékaře.**

Váš partner  
v očkování



GlaxoSmithKline